

AM2: Tracce delle lezioni-V settimana

SERIE DI POTENZE NEL CAMPO COMPLESSO

1. Definizione $z_n \in \mathbf{C}$ converge a z ($z_n \rightarrow_n z$) $\Leftrightarrow |z_n - z| \rightarrow_n 0$.

Siccome $|z_n - z|^2 = |Rez_n - Rez|^2 + |Imz_n - Imz|^2$, si ha che:

$$\begin{aligned} z_n \rightarrow_n z &\Leftrightarrow Rez_n \rightarrow_n Rez \quad \text{e} \quad Imz_n \rightarrow_n Imz \\ z_n \rightarrow_n z &\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon : n, m \geq n_\epsilon \Rightarrow |z_n - z_m| \leq \epsilon \quad (\text{Cauchy}) \end{aligned}$$

2. Definizione $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ converge sse $S_N := \sum_{n=1}^N z_n$ converge.
 $\sum_n z_n$ si dice assolutamente convergente se $\sum_n |z_n| < +\infty$.

(Cauchy) $\sum_n z_n$ converge $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N_\epsilon : |\sum_{n=N}^{N+p} z_n| \leq \epsilon \quad \forall N \geq N_\epsilon, \forall p$.

In particolare, $\sum_n |z_n| < +\infty \Rightarrow \sum_n z_n$ converge e in particolare,

$\limsup_n |z_n|^{\frac{1}{n}} < 1 \Rightarrow \sum_n |z_n| < +\infty \Rightarrow \sum z_n$ converge. Si ha cosí

3. Cauchy-Hadamard Sia $a_n \in \mathbf{C}$, $r := \limsup_n |a_n|^{-\frac{1}{n}}$. Allora

$z \in \mathbf{C}, |z| < r \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n| < +\infty$, $|z| > r \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n| = +\infty$

r := raggio di convergenza, $D_r := \{z : |z| < r\}$:= disco di convergenza .

ESEMPI. $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ converge in $|z| < 1$ e $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$.

$\exp z := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ converge $\forall z \in \mathbf{C}$

4. Definizione $O \subset \mathbf{C}$ é aperto, se $z_0 \in O, z_n \rightarrow_n z_0 \Rightarrow z_n \in O$ definitivamente (ovvero $z_0 \in O \Rightarrow \exists D_r(z_0) := \{z \in \mathbf{C} : |z - z_0| < r\} \subset O$).

5. Funzioni complesse di variabile complessa. Sia $f : O \rightarrow \mathbf{C}$.

f é **continua** in $z_0 \in O \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |z - z_0| \leq \delta \Rightarrow |f(z) - f(z_0)| \leq \epsilon$

f é **derivabile** in $z_0 \in O$ con derivata $f'(z_0)$ \Leftrightarrow

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |z - z_0| \leq \delta \Rightarrow \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) \right| \leq \epsilon$$

Anche qui, come nel caso reale: f é derivabile in $z_0 \Rightarrow f$ é continua in z_0 .

6. Esempio Sia $f(z) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ somma di una serie di potenze avente raggio di convergenza $r > 0$. Allora $f \in C^\infty(D_r)$.

Proviamo che $\frac{d^n f}{dz^n}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(n+k)!}{n!} a_{n+k} z^k \quad \forall z \in D_r$. Come nel caso reale, basta provare la formula per $n = 1$. Siano $z, z_0 \in D_\rho$, $\rho < r$. É

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z_0^{n-1} \right| \leq \sum_{n=2}^{\infty} |a_n| \left| \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} - n z_0^{n-1} \right|$$

Ora, $|z^n - z_0^n| = |(z - z_0)(z^{n-1} + z_0 z^{n-2} + \dots + z_0^{n-2} z + z_0^{n-1})| \leq |z - z_0| n \rho^{n-1} \Rightarrow$

$$\left| \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} - n z_0^{n-1} \right| = |z^{n-1} - z_0^{n-1} + z_0(z^{n-2} - z_0^{n-2}) + \dots + z_0^{n-2}(z - z_0)| \leq$$

$$\leq |z^{n-1} - z_0^{n-1}| + |z_0| |z^{n-2} - z_0^{n-2}| + \dots + |z_0|^{n-2} |z - z_0| \leq$$

$$\leq |z - z_0| \left[(n-1)\rho^{n-2} + (n-2)|z_0|\rho^{n-3} + \dots + |z_0|^{n-2} \right] \leq \frac{n(n-1)}{2} |z - z_0| \rho^{n-2}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} |a_n| \left| \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} - n z_0^{n-1} \right| \leq |z - z_0| \sum_{n=2}^{\infty} |a_n| \frac{n(n-1)}{2} \rho^{n-2} \xrightarrow{z \rightarrow z_0} 0$$

perché $\rho < r \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} |a_n| \frac{n(n-1)}{2} \rho^{n-2} < +\infty$.

$$7. \quad \exp(z+w) = \exp z + \exp w \quad \forall z, w \in \mathbf{C}. \quad \text{Segue da}$$

8. Lemma (Prodotto secondo Cauchy). $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n| + \sum_{n=0}^{\infty} |w_n| < +\infty \Rightarrow$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \sum_{j+k=n} z_j w_k \right| < +\infty, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j+k=n} z_j w_k \right) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} z_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} w_n \right)$$

$$\text{Infatti, } \exp(z+w) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+w)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n!} \sum_{j+k=n} \frac{n!}{j! k!} z^j w^k \right) =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j+k=n} \frac{z^j}{j!} \frac{w^k}{k!} \right) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!} \right) = \exp z \exp w$$

In particolare, $(\exp z)^p = \exp(pz) \quad \forall p \in \mathbf{N}, z \in \mathbf{C}, \exp p = (\exp 1)^p = e^p$, $(\exp(\frac{1}{p}))^p = e$. Dunque $\exp(\frac{1}{p}) = e^{\frac{1}{p}}$ e quindi $\exp(\frac{p}{q}) = (\exp \frac{1}{q})^p = (e^{\frac{1}{q}})^p = e^{\frac{p}{q}}$: $x \rightarrow \exp x, x \in \mathbf{R}$ é prolungamento continuo di $r \rightarrow e^r, r \in \mathbf{Q}$.

$$9. \text{ Formule di Eulero} \quad \exp(\pm it) = \cos t \pm i \sin t \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

$$\sin t = \frac{\exp(it) - \exp(-it)}{2i}, \quad \cos t = \frac{\exp(it) + \exp(-it)}{2} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

Da $\exp(it) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(it)^n}{n!}$ segue $Re(\exp it) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!} = \cos t$, $Im(\exp it) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin t$. In particolare, $\exp(2k\pi i) = 1 \quad \forall k \in \mathbf{Z}$, cioè $t \rightarrow \exp(it)$ è 2π -periodica.

Infine, da 7., $\exp(x+iy) = \exp x \exp(iy) = e^x (\cos t + i \sin t)$. In particolare, $\exp(z+2\pi i) = \exp z, \quad \forall z$.

$$10. \quad (i) \quad \exp(-z) = (\exp z)^{-1} \quad (ii) \quad \overline{\exp z} = \exp \overline{z}$$

$$(iii) \quad |\exp(it)| = 1 \quad \forall t \in \mathbf{R} \quad \text{e} \quad |z| = 1 \Rightarrow \exists ! t \in (-\pi, \pi] : z = \exp(it)$$

$$(i) \quad \exp z \exp(-z) = 1 \quad (ii) \quad \exp \overline{z} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N \frac{\overline{z}^n}{n!} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \overline{\sum_{n=0}^N \frac{z^n}{n!}} = \overline{\exp z}$$

$$(iii) \quad |\exp(it)|^2 = \exp(it) \overline{\exp(it)} = \exp(it) \exp(-it) = 1. \quad \text{Poi,} \\ z = x + iy, \quad x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow \exists ! t \in [0, \pi] : x = \cos t \quad \text{e} \quad y = \sin t \quad \text{se} \\ y \geq 0, \quad x = \cos(-t), \quad y = \sin(-t) \quad \text{se} \quad y < 0.$$

11. Funzioni circolari ed iperboliche sui complessi

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall z \in \mathbf{C}$$

$$\sinh z := \frac{1}{2}(\exp z - \exp(-z)) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall z \in \mathbf{C}$$

$$\cosh z := \frac{1}{2}(\exp z + \exp(-z)) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad \forall z \in \mathbf{C}$$

$$12. \quad (i) \quad \exp(iz) \equiv \cos z + i \sin z, \quad \exp(-iz) \equiv \cos z - i \sin z$$

$$(ii) \quad \cos z \equiv \frac{\exp(iz) + \exp(-iz)}{2} \equiv \cosh iz \quad \sin z \equiv \frac{\exp(iz) - \exp(-iz)}{2i} \equiv \frac{\sinh(iz)}{i}$$

Da (ii) segue: $\sin z, \cos z$ sono funzioni 2π -periodiche mentre $\sinh z, \cosh z$ sono $2\pi i$ -periodiche. Inoltre, $\sin^2 z + \cos^2 z \equiv 1$, $\cosh^2 z - \sinh^2 z \equiv 1$

13. Definizione di $\arg z, \log z, z \in \mathbf{C}$

Dato $z \in \mathbf{C}$, $\arg z$ (**argomento di** z) é l'unico reale in $(-\pi, \pi]$ tale che

$$z = |z| \exp(i \arg z)$$

Notiamo che, per periodicitá, $z = |z| \exp(i(\arg z + 2k\pi)) \quad \forall k \in \mathbf{Z}$. Scrivereemo

$$\operatorname{Arg} z := \{\arg z + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$$

Ora, dato $w \in \mathbf{C}, w \neq 0$

$$\exp z = w \Leftrightarrow \exp(Re z) \exp(i Im z) = |w| \exp(i \arg w) \Leftrightarrow$$

$$\exp Re z = |w| \text{ e } Im z - \arg w \in 2\pi \mathbf{Z} \quad \text{cio\'e}$$

$$\exp z = w \Leftrightarrow z \in \{\log|w| + i \operatorname{Arg} w\}$$

$$\text{Porremo} \quad \operatorname{Log} w := \{\log|w| + i \operatorname{Arg} w\} \quad \forall w \in \mathbf{C}, w \neq 0$$

La funzione $\operatorname{log} w := \log|w| + i \arg w$ si chiama valore principale del logaritmo.

Esempi. $\operatorname{Log} x = \log x + 2k\pi i, \forall x > 0, \operatorname{Log} x = \log|x| + (2k+1)\pi i, \forall x < 0.$
 $\operatorname{log}(-1) = \pi i, \operatorname{log} i = \frac{\pi}{2}i, \operatorname{Log}(1-i) = \log\sqrt{2} + (2k - \frac{1}{4})\pi i.$

Esercizi. $\operatorname{Log}(zw) = \operatorname{Log} z + \operatorname{Log} w$ ove, per $A, B \subset \mathbf{C}, A + B := \{a + b : a \in A, b \in B\}$. Infatti $\operatorname{Arg}(zw) = \operatorname{Arg} z + \operatorname{Arg} w$.

$$\operatorname{Log}(-z) = \operatorname{Log} z + \pi i \quad \forall z \neq 0.$$

Trovare l'errore in $z^2 = (-z)^2 \Rightarrow \operatorname{Log}(z^2) = \operatorname{Log}(-z)^2 \Rightarrow \operatorname{Log}z + \operatorname{Log}z = \operatorname{Log}(-z) + \operatorname{Log}(-z) \Rightarrow 2\operatorname{Log}z = 2\operatorname{Log}(-z) \Rightarrow \operatorname{Log}z = \operatorname{Log}(-z).$

14. Potenze in \mathbf{C} Se $w, z \in C, w \neq 0$

$$w^z := \exp(z \operatorname{Log} w) = \exp\{z [\log|w| + i(\arg w + 2k\pi)]\} \quad k \in \mathbf{Z}$$

Esempi. Sia $z = n \in \mathbf{N}; w^n = \exp\{n [\log|w| + i(\arg w + 2k\pi)]\} = \exp\{n \log|w|\} \exp\{ni(\arg w + 2k\pi)\} = |w|^n [\exp\{i(\arg w + 2k\pi)\}]^n = w \times \dots \times w$ (n volte).

Se $z = \frac{1}{n}, n \in \mathbf{N}, a^{\frac{1}{n}} = \{|a|^{\frac{1}{n}} \exp i \frac{\arg a + 2k\pi}{n}, k = 0, \dots, n-1\}$ (le n radici complesse di a). Se $z \notin \mathbf{Q}, a^z$ é un insieme infinito. In particolare, $e^z = \exp z$ se e solo se $z \in \mathbf{Z}$.

APPENDICE

A1: Prova di 8.

$$\text{Siano } s_N := \sum_{n=0}^N z_n, \quad \sigma_N := \sum_{n=0}^N w_n$$

$$p_N := \sum_{n=0}^N \left(\sum_{j+k=n} z_j w_k \right) = z_0 w_0 + (z_0 w_1 + z_1 w_0) + \dots + (z_0 w_N + z_1 w_{N-1} + \dots + z_{N-1} w_1 + z_N w_0) \\ = z_0 (w_0 + w_1 + \dots + w_N) + z_1 (w_0 + \dots + w_{N-1}) + \dots + z_N w_0. \quad \text{Dunque}$$

$$|s_N \sigma_N - p_N| =$$

$$|z_0 (w_0 + \dots + w_N) + z_1 (w_0 + \dots + w_{N-1}) + \dots + z_{N-1} (w_0 + \dots + w_N) + z_N (w_0 + \dots + w_N) -$$

$$[z_0 (w_0 + w_1 + \dots + w_N) + z_1 (w_0 + \dots + w_{N-1}) + \dots + z_{N-1} (w_0 + w_1) + z_N w_0] =$$

$$|z_1 w_N + z_2 (w_{N-1} + w_N) + \dots + z_{N-1} (w_2 + \dots + w_N) + z_N (w_1 + \dots + w_N)| \leq$$

$$\leq \sum_{j=1}^n \left[|z_j| \left| \sum_{i=1}^j w_{N-j+i} \right| \right] + \sum_{j=n+1}^N \left[|z_j| \left| \sum_{i=1}^j w_{N-j+i} \right| \right] \leq \\ \leq \left[\sum_{j=1}^n |z_j| \right] \left[\sum_{k=N-n+1}^{\infty} |w_k| \right] + \left[\sum_{j=n+1}^{\infty} |z_j| \right] \left[\sum_{k=1}^{\infty} |w_k| \right] \quad n := \left[\frac{N}{2} \right]. \quad \text{Da} \\ \sum_{k=N-\left[\frac{N}{2} \right]+1}^{\infty} |w_k| \rightarrow_{N \rightarrow +\infty} 0, \quad \sum_{j \geq \left[\frac{N}{2} \right]+1} |z_j| \rightarrow_{N \rightarrow +\infty} 0, \quad \sum_j |z_j| < +\infty, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |w_k| < \infty \\ \text{segue } |s_N \sigma_N - p_N| \rightarrow_{N \rightarrow +\infty} 0 \quad \text{e quindi} \quad \lim_N p_N = \lim_N s_N \sigma_N.$$

$$\text{ESERCIZIO.} \quad e := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{n})^n \quad \text{É}$$

$$(1 + \frac{1}{n})^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k! (n-k)!} \frac{1}{n^k} < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \quad \text{perché} \quad \frac{n!}{n^k (n-k)!} = \frac{(n-k)!(n-k-1)\dots n}{(n-k)! n^{n-k}} < 1$$

$$\text{e quindi} \quad \limsup_n (1 + \frac{1}{n})^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

$$\text{Viceversa, } n > n_0 \Rightarrow (1 + \frac{1}{n})^n > \sum_{k=0}^{n_0} \frac{n!}{k! (n-k)!} \frac{1}{n^k} \Rightarrow \liminf_n (1 + \frac{1}{n})^n \geq \sum_{k=0}^{n_0} \frac{1}{k!}, \quad \forall n_0$$

$$\text{perché } \frac{n!}{n^k (n-k)!} = (1 - \frac{1}{n}) (1 - \frac{2}{n}) \dots (1 - \frac{k-1}{n}) \rightarrow_n 1.$$

Quindi

$$\liminf_n (1 + \frac{1}{n})^n \geq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$$